

Шкала количественной оценки мужской копулятивной функции.

Ф.И.О. _____ Возраст _____
 Дата исследования _____ Первичное
 исследование _____ В период лечения _____ После лечения
 Лечение _____

I. В течение последнего месяца как часто у Вас возникало желание иметь половое сношение (независимо от эрекции)?	не возникало	1-2 раза	3-4 раза	2-3 раза в неделю	Почти ежедневно	Ежедневно
	0	1	2	3	4	5
II. В течение последнего месяца как часто у Вас возникали спонтанные (не связанные с половой активностью) эрекции?	не возникали	несколько раз	2-3 раза в неделю	4-5 раз в неделю	Ежедневно	Ежедневно многократно
	0	1	2	3	4	5
III. Когда Вы в последний раз совершали или были способны совершить повторное половое сношение в течение суток?	никогда	В возрасте от 25 до 35 лет	В возрасте от 36 до 50 лет	Способен в настоящее время	Практикую эпизодически	Практикую постоянно
	0	1	2	3	4	5
IV. В течение последнего месяца каково Ваше настроение перед сношением?	Из-за страха неудачи попыток не предпринимал	Из-за неуверенности ищущий предложения уклониться от сношения	Испытывал неуверенность, но от попыток не уклонялся	Неуверенности почти не испытывал	Неуверенности нет	Только жду наслаждения
	0	1	2	3	4	5
V. В течение последнего месяца сколько попыток иметь половое сношение Вам удалось?	Ни одна	Меньше половины	Больше половины	Подавляющее число	Все, за редким исключением	Все
	0	1	2	3	4	5
VI. В течение последнего месяца какова была эрекция при половых сношениях?	Отсутствовала	В большинстве случаев была недостаточной для введения полового члена, пропадала перед введением или во время сношения	Для ее возникновения требовалась активная стимуляция, была неполной, но обычно достаточной для сношения	Была иногда неполной, но вполне достаточной для сношения	Была полной за редким исключением	Всегда была полной
	0	1	2	3	4	5

VII. В течении последнего месяца какова была продолжительность половых сношений?	Нельзя определить из-за отсутствия семяизвержения при сношениях	Более 15 минут (непрекращающиеся фрикции) или несколько секунд	Явно излишняя или около 30 секунд	Излишняя или около 3 минут	От 3 до 6 минут	Могу ее регулировать
	0	1	2	3	4	5
VIII. В течении последнего месяца каково было семяизвержение?	Оно отсутствовало при сношениях	Наступало не при каждом сношении	Низкоинтенсивным (вытекание эякулята) или болезненным	Умеренноинтенсивным	Интенсивным	Крайнеинтенсивным
	0	1	2	3	4	5
IX. В течение последнего месяца каков был оргазм?	Он отсутствовал при семяизвержении	Наступал не при каждом семяизвержении	Низкоинтенсивным	Умеренноинтенсивным	Интенсивным	Крайнеинтенсивным
	0	1	2	3	4	5
X. В течение последнего месяца сколько завершённых (независимо от их качества) половых сношений Вы имели?	Ни одного	От 1 до 3	1-2 в неделю	2-3 в неделю	3-4 в неделю	Ежесуточно
	0	1	2	3	4	5
XI. В течение последнего месяца сколько у Вас произошло семяизвержений (при сношении, поллюции, онанизме и др.)?	Ни одного	От 1 до 3	1-2 в неделю	2-3 в неделю	4-6 в неделю	Ежесуточно одно или несколько
	0	1	2	3	4	5
XII. Как давно наблюдается у Вас расстройство половой функции?	С начала половой жизни	От 10 до 20 лет	От 1 года до 10 лет	Не отмечаю существенного расстройства	Не отмечаю какого-либо расстройства	Не задумывался о возможности расстройства
	0	1	2	3	4	5
XIII. Как Вы оцениваете свою половую потенцию за последний месяц?	Полностью отсутствовала	Неудовлетворительно	Удовлетворительно	Хорошо	Хорошо-отлично	Отлично
	0	1	2	3	4	5

Распечатайте шкалу, заполните ее и возьмите с собой, когда пойдете на прием в нашу клинику.

Многопрофильная медицинская клиника «БЛАГОЕ ДЕЛО»

+7 (495) 741-96-01 (пн-вс)

+7 (495) 741-38-05 (пн-сб)

www.blagoe-delo.ru